n° 85.

M. Milliet, Lieutenant de M. le premier Chirurgien
a Coucy, a fait part à l'académie d'une cure qu'il a
faite à un homme qui en battant du grain reçut une
Epine dans la partie moyenne de l'œil droit. L'auteur
dit que ce fut dans le globe, mais nous croions qu'elle
glissa entre le globe et l'orbite. cette Epine fut retenue
dans cet endroit pendant 8. jours, où elle occasionna
un depôt de pus, auquel l'auteur donna issue au
moyen d'une incision qu'il fit avec une lancette.
il tira ensuite le corps étranger et le malade guerit
moyenant des pansemens avec des collires fort composés
que l'auteur employa.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

M. Milliet dit qu'il sentoit de la fluctuation dans
le globe même, qu'il paroissoit sous la cornée un
pus fort épais de couleur cendrée, et qu'il en sortit
une cuillerée par l'incision. Malgré l'exposé
de l'auteur, je crois que la matiere s'étoit ramassée
entre le globe et la conjonctive, et avec d'autant plus
de raison, qu'il dit dans un autre endroit, qu'elle
envelopoit tout le globe. une cuillerée de pus qui
auroit été accumulée dans le globe auroit detruit
sans doute, l'organe de la vue, par la confusion qui
en auroit resulté: l'issuë des corps transparens

ARC 55 n° 14

aurois naturellement accompagné cette du pus;

L'ouverture ~~que la lancette a fait~~ étoit assés grande,
puisque M. Millier la continua, depuis l'endroit
du corps étranger, jusques à la partie inferieure
de l'orbite; ce qui la suppose de plusieurs lignes,
l'œil étant devenu prodigieusement gros. On sait
d'ailleurs que la conjonctive est susceptible de devenir
extremement épaisse par inflammation et boursouflement.
il n'est pas étonnant que le malade n'ait commencé
à voir quelque clarté que le 6.e jour, et que jusqu'au
10.e l'auteur n'ait pas pu distinguer la pupille. Je dis
la pupille, parce que l'auteur dit avoir apperçu ce
jour là, le cristallin, ce qui ne tombe pas sous les sens.
il a donc falu que l'inflammation ait été dissipée, et que
la legere suppuration ait favorisé le degorgement de la
conjonctive, pour que les rayons de lumiere se soient faits
sentir, à travers cette membrane qui doit être naturellement
trés-mince. La guerison n'a été operée qu'après le
30.e jour. Je croi qu'elle auroit été plutot terminée
si l'auteur avoit employé des collires d'une vertu
plus douce, et moins vulneraires et resolutifs, que ceux

quil a lemployé, ce qui doit avoir retardé la suppuration
et par consequent la cure.

Ce fait ne contenant de la part de l'auteur
aucune remarque utile, ~~[illegible]~~,
nous jugeons quil ne merite aucune part dans
nos memoires. a paris le 7 fevrier 1760

Recolin

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE